

ಗಂಟು ಬಿಜ್ಞಾನ





ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕರಣ

ಸಸ್ಯ ಪರಾವಲಂಬಿ ನೆಮಟೋಡ್ ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೇರಿನ ಗಂಟುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತಿರೇಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇರುಗಳ ಒಳಗೆ ಗಾಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಸ್ಯವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ, ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಣಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಳುವರಿಯು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನೆಮಟೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಗಂಟುಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ಉತ್ತಮ, ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪರವಾಲಂಬಿ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡವೂ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ

ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಜವಾದ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿಜವಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ನಿಜವಾದ ನೆಮಾಟೋಡ್.

ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ನಿಜವಾದ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್

1.



ನೆಮಟೋಡ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಅದನ್ನು ತಾಜಾ ನೀರಿನ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೂ ಕೂಡಾ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೋಂಕನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ).

2.



ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ನೆಮಟೋಡ್ ಗಳು, ಸರ್ವಭಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ನೆಮಟೋಡ್‌ಗಳು, ಎಂಟಾಮೊ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನೆಮಟೋಡ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ (EPN) ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ.



3.



ಸಸ್ಯ ಪರಾವಲಂಬಿ ನೆಮಟೋಡ್ ಗಳ
ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

4.



ಎರೆಹುಳಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಹುಳಗಳು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್
ಟೈಲ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ಟ್, (ಟಾರ್ಡಿಗ್ರೇಡ್ಸ್)
ನಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮಣ್ಣಿನ
ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೌನಾದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ.


5.



ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ (ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ,
ಪಪ್ಪೂರಿಯೋಸಿಲಿಯಮ್, ಪೊಚೋನಿಯಾ,
ಆತ್ರೋಬೋಟ್ರಿಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಯಾ
ಬಾಕ್ಟೆರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಯಾ ಜಾತಿಗಳು)
ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಯಾ (ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಯಾ ಸಬ್‌ಜಿಲಿಸ್,
ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಯಾ ಅಮಿಲಿಕೋಪೇಸಿಯೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಯಾ
ಫರ್ಮಿಸ್, ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಸಿರಿಂಗೇಸ್,
ಪ್ಸಿಯೋಡೋಮೊನಾಸ್ ಫ್ಲೋರೆಸ್ಕೆನ್ಸ್).



ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ



ಹೊಸ ಮತ್ತು
ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಧಾನ

೨೦೨೧

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ,
ನಿಜವಾದ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್




ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ



ಉತ್ಕೃಷ್ಟ
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ



ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ



ಗಿಡ ಪರವಾಲಂಬಿ ನೆಮಟೋಡ್ ಗಳ
ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ



ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು
ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ



ನಿಖರ ಬಳಕೆ



ಅನುಕೂಲಕರ
ಎಕೋಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್



ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು

ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು
ನಿಮ್ಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು



ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ

ರೆಕ್ಲೆಮೆಲ್™ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಾನಿಕಾರಕ ನೆಮಟೋಡ್ ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉತ್ಪಾದಕ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಸಾಲಿಬ್ರೋ™

ರೆಕ್ಲೆಮೆಲ್™ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ

ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್



™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2024 Corteva.

ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

1 ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಧಾನ ದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೆಮಾಟೋಡ್ :

ಅನುಪಚರಿಸದ



ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ನೆಮಾಟೋಡ್



- ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾದ ರೂಟ್-ನಾಟ್ ನೆಮಾಟೋಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ನೆಮಾಟೋಡ್ ಗಳು 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗಾಗಿ "ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ" ಚಲಿಸುವ ತಮ್ಮ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಜಾ ನೀರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಾಲಿಬ್ರೋ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜವಾದ ನೆಮಾಟೋಡ್ ಆಗಿದೆ.

ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

2 ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದುದು :



ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಶಿಲೀಂಧ್ರ



ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ನೆಮಟೋಡ್



ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ

• ಇಂದು ರೈತ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

• ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

3 ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬೇರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ :

ರೈತರ ಪದ್ಧತಿ



ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್



- ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್ ಬೇರು-ಗಂಟು ನೆಮಾಟೋಡ್ ಗಳ ಸೋಂಕಿನ ಜೀವನದ ಹಂತ J2 ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುರುತುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಲಿಬ್ರೋದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಬೇರು ರಕ್ಷಣೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿಕಂನಲ್ಲಿ (ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ) ಸಾಲಿಬ್ರೋ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್‌ಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 120 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬೇರು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

4 ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಕ್ಷಣೆ:

ರೈತರ ಪದ್ಧತಿ



ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ನೆಮಾಟೋಡ್



- ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ನೆಮಾಟೋಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬೇರು ಗಂಟು ನೆಮಾಟೋಡ್ ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಳಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

5 ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ :

ರೈತರ ಪದ್ಧತಿ



ರೈತರ ಪದ್ಧತಿ



ರೈತರ ಪದ್ಧತಿ



ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್



ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್



ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್



• ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್ ಬೇರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

• ಸಾಲಿಬ್ರೋ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ.

ಮೌಲ್ಯ ನಿರೂಪಣಾ ಪದ್ಧತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ರಾಜ್ಯಗಳು


5

ರೈತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

9000

ವಿತರಕರನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

650



69

ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ



78

ಟೊಮ್ಯಾಟೋ



100

ಸೌತೆಕಾಯಿ



61

ಬದನೆ

ನಿಜವಲ್ಲದೇ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ



ಮಾನದಂಡಗಳು

ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಟೊಮ್ಯಾಟೋ

ಬದನೆ

ಗಾಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್
(ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ಹಾಗೂ
ರೈತರ ಪದ್ಧತಿ)

1.8 Vs 3.1
(@150 DAA)

1.4 Vs 3.2
(@90 DAA)

2.0 Vs 2.9
(@150 DAA)

1.0 Vs 3.0
(@120 DAA)

% ಎ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ತೂಕ
(ರೈತರ ಪದ್ಧತಿ ಯೊಂದಿಗೆ)

5.6%

10.5%

6.3%

9.3%

ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಳುವರಿ
(ರೈತರ ಪದ್ಧತಿ ಯೊಂದಿಗೆ)

3.2%

8.2%

6.3%

8.5%

ಮೌಲ್ಯ ನಿರೂಪಣಾ ಪದ್ಧತಿ



ಈ ಡೇಟಾವು ಅಂತರಲಕ ಮೌಲ್ಯ ನಿರೂಪಣಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

- ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ : ರೈತರ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪಲಸರದ ಪಲಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ನಿಖರವಾದ ಉಪಾಯಗಳು

ಮಾಡ
ಬೇಕಾಗಿರುವುದು



ತಪ್ಪು

1.

ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು & ಏಕರೂಪದ ಬೇಸಾಯ. ಸಾಲಿಬ್ರೋ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಹೆಂಟೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

1.

ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 200 ಮಿಲೀಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.

2.

ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 2-3 ಅಂಗುಲ ಆಳದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

2.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರಿ.

3.

ಬಿತ್ತನೆ/ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ 1-4 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಗುಳಿ ಡ್ರೆಂಚ್‌ನಂತೆ 20 ಲೀ ನೀರಿಗೆ 10 ಮಿಲೀ ಸಾಲಿಬ್ರೋ @ 10 ಮಿಲೀ (ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 200 ಮಿಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 0.1 ಮಿಲೀ ಸಾಲಿಬ್ರೋ) ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

3.

ಬಿತ್ತನೆ/ ನಾಟಿಯನ್ನು ಸಾಲಿಬ್ರೋ ಉಪಚರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದಾಚೆಗೆ ಮಾಡಬಾರದು.



ನಿಖರವಾದ ಉಪಾಯಗಳು

ಮಾಡ
ಬೇಕಾಗಿರುವುದು



ತಪ್ಪು

4.

ಸಾಲಿಬ್ರೋ™ ಉಪಚರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದ
ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ/ ನಾಟಿ
ಮಾಡಬೇಕು.

4.

ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆಯೇ
ಸಾಲಿಬ್ರೋ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ,
ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಲ್ಮೈ ಸಿಂಪಡಣೆ ಗೆ
ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

5.

ಬಿತ್ತನೆ/ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ
ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

5.

ಬಿತ್ತನೆ/ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ
ಸಾಲಿಬ್ರೋ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

6.

ಡ್ರಿಪ್ ಕೆಮಿಗೇಶನ್ ಗಾಗಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಾಲಿಬ್ರೋ
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.

6.

ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ
ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು
ಆಳದಲ್ಲಿ /ನಾಟಿಮಾಡಬಾರದು.



ನಿಜವಾದ ಶಿಫಾರಸ್ಸು




ಪ್ರಮಾಣ

10 ಮಿಲೀ ಪ್ರತಿ 20 ಲೀ.ನೀರು
(ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 0.1 ಮಿಲೀ
ಸಾಲಿಬ್ರೋ200 ಮಿಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ).



ಬೆಳೆ

ಸೌತೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ,
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬದನೆ.



ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ

ಬಿತ್ತನೆ (ನಾಟಿ) 1-4 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನ.



ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ



ಡ್ರಿಪ್ ಕೆಮಿಗೇಷನ್

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.



ಹೋಲ್ ಡ್ರೆಂಚ್

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಇಂಚು ಆಳದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು
200ಮಿಲೀ ಡ್ರೆಂಚ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ.

*Always read and follow label direction.