

खरपतवारों के प्रकार

घास



इस्तेमाल के चरण

इचिनोकलोआ कोलोना – लालसावा



इस्तेमाल के चरण

इचिनोकलोआ क्रस गैली – सफेदसावा



इस्तेमाल के चरण

लैटोकलोआ चीनेसीस – चिड़िया घास / बंदरपुंछिया / फुलबिहारी

चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार



इस्तेमाल के चरण

लुडविजिग परविलोरा – भिर्च बूटी



इस्तेमाल के चरण

मोनोकोरिया – पान पत्ता



इस्तेमाल के चरण

एविलप्ता अल्बा – गुडु भाजी

सेज(नरकट)



इस्तेमाल के चरण

साइप्रस डिफोर्मिस – चुडुका / चुडुरी



साइप्रस इरिया

CO44NX1HIN



™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2024 Corteva.


*Always read and follow label directions

facebook.com/CortevaIN twitter.com/corteva www.instagram.com/corteva www.linkedin.com/company/corteva

For Customer Care Call Us On Our National Toll Free Number 1860 – 1800 – 186

www.corteva.in

आज में झलके नया कल



अधिक जानकारी के लिए
QR कोड स्कैन करें

नोविक्सिड™

रिंस्कोर™ एक्टिव

खरपतवारनाशक

CORTEVA
agriscience

www.corteva.in

खरपतवार प्रबंधन के आनंदमय सुझाव

- **नोविक्सिड™** का प्रयोग सुझाई गई मात्रा के अनुसार 500 मिली/एकड़ में खरपतवारों की 3-5 पत्तियों की अवस्था में करें।
- सुनिश्चित करें कि छिड़काव के दौरान सभी लक्षित खरपतवारों की पत्तियों पर दवा फैले।
- फलड जेट / फ्लैट फैन नोज़ल लगे नैपसैक स्प्रेयर का उपयोग करें।
- छिड़काव के दोहराव को न्यूनतम करें।
- गैर-लक्षित चौड़ी पत्तीवाली फसलों पर नुकसान को न्यूनतम करने के लिए छिड़काव को ढालें।
- प्रयोग करने के बाद 1-2 दिनों के अंदर खेत को पानी से भर दें, ताकि खरपतवारों पर प्रबंधन की प्रभावकारिता हासिल हो सके।
- **नोविक्सिड™** का प्रयोग करने के बाद 7-10 दिनों के अंदर नाइट्रोजन युक्त ऊर्वरक का उपयोग करें।
- प्रयोग के दौरान उपयुक्त पीपीई किट का उपयोग करें।



आनंद के कुछ अनुभव

खरपतवारों के प्रबंधन की नई टेक्नोलॉजी जो प्रमुख धान के क्षेत्रों में किसानों को आनंदमय अनुभव प्रदान कर रही है।

खरपतवार बायोमास में अंतर प्रति एकड़ *



ऐसे होगा आनंद का आरम्भ

पिछले कुछ सालों में धान के खरपतवारों के स्वरूप ने, उनके उभरने के तरीके और तीव्रता के चलते उनके प्रबंधन को और भी कठिन बना दिया है। आपको इसी बोझ से मुक्त करते हुए **नोविक्सिड™** बनाएगा धान के खरपतवार प्रबंधन को आनंद - दायक। क्योंकि **नोविक्सिड™** में है खरपतवार प्रबंधन की सर्वोत्तम तकनीक।



साइप्रस जैसे ज़िद्दी खरपतवारों सहित विविध प्रकार की खरपतवारों के उत्कृष्ट प्रबंधन, हाथ से की जानेवाली निंदाई से छुटकारा, उल्लेखनीय बचत, कई बार छिड़काव के झंझट और टैंक मिश्रण की परेशानी से भी मुक्ति।

छिड़काव के 3-5 दिनों के भीतर ही खरपतवार पर शुरुआती लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवारों में मूर्छित अवस्था एवं घास और झाड़ियों के जोड़ों में सूजन देखी जाती है।



3-5 दिन



10-14 दिन



फसल और खरपतवारों के बीच पोषक तत्वों और पानी के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा पर रोकथाम करता है।

मुख्य खरपतवारों पर उत्कृष्ट प्रभावकारिता, जिससे खरपतवारों की दोबारा वृद्धि नहीं दिखाई देती और लंबे समय तक खरपतवारों पर नियंत्रण मिलता है।



प्रभावी और लंबी अवधि का प्रबंधन

खरपतवारों से बनने वाले बायोमास को कम करता है, जिससे हाथ से निंदाई की बचत होती है और फसल को बेहतरीन वृद्धि मिलती है।

नोविक्सिड™ पौधे की प्रणाली में झटपट सोख लिया जाता है, तुरंत असर दिखाता है और यदि प्रयोग करने के 1 घंटे बाद बारिश होती भी है तो उसकी प्रभावकारिता पर कोई असर नहीं पड़ता।



बारिश में भी टिका रहे



बारिश में टिके रहने की क्षमता सक्रिय तत्वों को 100% उपलब्ध कराने में मदद करती है, जिससे बेहतरीन खरपतवार नियंत्रण मिलता है।

नोविक्सिड™ का पर्यावरण और जीवों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, साथ ही यह स्थायी या सतत कृषि और एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के हिसाब से भी एक निपुण और कारक साधन है।



सकारात्मक टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल



यह कई पीढ़ियों तक पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।