ਨਦੀਨ ਦੀਆ ਕਿਸਮਾਂ

ਤੰਗ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ

ਸਵਾਂਕੀ

ਸਵਾਂਕ

ਘੋੜਾ ਘਾਹ

ਚੌੜਾ ਪੱਤੀ ਨਦੀਨ

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ

ਪਾਨ ਪੱਤਾ

ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ

ਮੋਥਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਦੀਨ

ਢੀਲੀ

ਛੱਤਰੀ ਵਾਲਾ ਮੋਥਾ

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2024 Corteva.

*Always read and follow label directions

facebook.com/CortevaIN twitter.com/corteva www.instagram.com/corteva www.linkedin.com/company/corteva

For Customer Care Call Us On Our National Toll Free Number 1860 – 1800 – 186

www.corteva.in

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

ਨੋਵਿਕਸਿਡ™
ਰਿੰਸਕੋਰ™ ਐਕਟਿਵ

ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ

CORTEVA™ agriscience

www.corteva.in

ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਆਨੰਦਮਈ ਸੁਝਾਅ

- **ਨੋਵਿਕਸਿਡ**™ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ੫੦੦ ਮਿਲੀ/ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ 3-5 ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋ।
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਛਿੜਕਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਫੈਲੇ।
- ਫਲੱਡ ਜੈਟ/ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ।
- ਗ਼ੈਰ-ਟੀਚਾ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।
- ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਦੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।
- **ਨੋਵਿਕਸਿਡ**™ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੭-੧੦ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
- ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੌਰਾਨ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟ ਵਰਤੋ।

ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ

ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਝੋਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਅਨੁਭਵ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ।



ਨੋਵਿਕਸਿਡ™ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ | ਨਦੀਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ | ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁਟਣਾ | ਨਦੀਨ ਬਾਇਓਮਾਸ

ਇੰਝ ਹੋਏਗੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਵਿਕਸਿਡਠਚ ਬਣਾਏਗਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ। ਕਿਉਂਕਿ **ਨੋਵਿਕਸਿਡ**™ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਕਨੀਕ।

ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਕੰਟਰੋਲ

ਡਿੱਲੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਨਦੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਚੰਗੀ ਬਚਤ, ਕਈ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਝੰਝਟ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੇ

ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ 3-5 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਦੀਨ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਨਦੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਮੋਥਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3-5 ਦਿਨ

10-14 ਦਿਨ

ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਮੁੱਖ ਨਦੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਸਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦੋਬਾਰਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਦੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਨਦੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ

1Hr

ਨੋਵਿਕਸਿਡ™ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ੧ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ 100% ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੌਕਸੀਕੋਲੋਜਿਕਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ

ਨੋਵਿਕਸਿਡਠਚ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਇਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।